


◉ Minimálisra csökkenthető a szövődmények száma ◉ Új sebészeti eljárás hazánkban a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás kezelésére ◉ Az OEP is finanszírozza

## A hűtött termoterápia kíméletes és hatékony eljárás



### Napi mérleg

#### Axel Ullrich

professzor, világhírű rákkutató kapta meg a Debrecen Díj a Molekuláris Orvostudományért díjat, a Debreceni Egyetem által alapított kitüntetést.

A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás (BPH) a férfiakban általában 50 éves kortól észlelhető, és az életkor növekedésével egyre gyakrabban fordul elő. A BPH az idősödő férfiak leggyakoribb megbetegedése.

Az utóbbi két évtizedben a BPH kezelésére több

új, alternatív eljárást vezetnek be. Ezek egyike a mikrohullámú termoterápia.

– Budapesten, az Istenhegyi Klinikán a rendkívül modern „hűtött prostata-termoterápiát”, azaz hűtésrel működő termoterápiás kezelést alkalmazunk – mondja dr. Dimitar Sumov.

Különböző tanulmányok eredményei alapján a TUMT kevés szövődménnyel járó, biztonságos és hatékony. Az eljárás ötvözi a korábbi megoldások előnyeit azzal, hogy a folyamatos hűtésnek köszönhetően nem károsodik a húgycső szövete. A mini-

málisan invazív beavatkozás, helyi érzéstelenítésben és azon betegek esetében is alkalmazható, akik a nagyobb műtéti terhelésre nem alkalmasak.



**SZABÓ  
Z. LEVENTE**  
[WWW.METROPOL.HU](http://WWW.METROPOL.HU)



KATONA LÁSZLÓ

► Az ultrahangvizsgálat mutatja meg egyértelműen, hogy a hólyag ki tud-e teljesen ürülni

## Sokan küzdenek ilyen problémával

A prosztata jóindulatú megnagyobbodása (BPH) a férfiak körében is intim témának számít, amelyről legfeljebb orvosukkal váltanak szót, velük is leginkább csak akkor, amikor vizeleti panaszaik súlyosbodnak.

Pedig problémáikkal nincsenek egyedül. Hazánkban évente mintegy 400 ezer beteg szorul orvosi kezelés-

re a panaszok következtében. A kezelésektől való félelem nem minden ok nélküli, hiszen a jelenleg ismert gyógyszeres terápia hatékonysága nem a legtekintélyesebb, az alkalmazott radikálisabb műtéti beavatkozásoknak pedig egyike sem kockázatmentes, ráadásul egy sor kellemetlen mellékhatással járhatnak.

● SZABÓ Z. LEVENTE

### Tünetek

Jóindulatú prosztata megnagyobbodásra utaló jelek:

- 1 Nehezen meginduló, illetve gyakran elakadó vizelet. Sokszor kell „hasprést” alkalmazni.
- 2 Gyakori és sürgető vizeleti kényszer.
- 3 Többszöri éjszakai látogatás a mellékhelyiségben.
- 4 A vizelet után a hólyag telítettségének érzése nem szűnik meg, újabb vizeleti inger lép fel.
- 5 Ugyancsak jellemző a vizelet nehéz befejezése, az úgynevezett „utócspegetés” jelentkezése.